


Škály pro hodnocení bolesti

Číselná škála (NRS-11)^{1,2,3}

Mírná bolest by byla považována za skóre bolesti 1–3, střední bolest za skóre 4–7 a silná bolest za skóre >7.⁴



Vizuálně analogová škála (VAS)^{1,5}



Obličejová škála bolesti (FPS)^{1,6}

U pacientů s určitou, i když omezenou schopností komunikace, jako jsou malé děti a starší pacienti, může být obličejová škála bolesti velmi užitečná.⁶



1. Guidelines for the management of acute pain in emergency situations, European Society of Emergency Medicine 2020.
 2. Breivik H, Borchgrevink PC, Allen SM, et al. Assessment of pain. Br J Anaesth 2008;101:17-24.
 3. Downie WW, Leatham PA, Rhind VM, et al. Studies with pain rating scales. Ann Rheum Dis 1978;37:378-81.
 4. Hartrick CT, Kovan JP, Shapiro S. The numeric rating scale for clinical pain measurement: a ratio measure? Pain Pract 2003;3:310-6.
 5. Arthur AO, Whiteside S, Brown L, et al. Patient use of tablet computers to facilitate Emergency Department pain assessment and documentation. ISRN Emergency Medicine 2012;2012:Article ID 254530.
 6. Wong-Baker FACES Foundation. Wong-Baker FACES® Pain Rating Scale. Available at <http://wongbakerfaces.org/> (Accessed January 2020).